

CAC
Bitternut hickory
Carya cordiformis

CARYER CORDIFORME

2041-2070

Cette fiche est un résumé des connaissances scientifiques les plus à jour pour cette espèce. Ces résultats sont basés sur des études de vulnérabilité des essences forestières, ainsi que sur des prédictions climatiques pessimistes (RCP 8.5), pour un futur proche (2041-2070).

INSECTES ET MALADIES À SURVEILLER



Aucun insecte et aucune maladie ne menace présentement la production de cette essence

RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE



Moyenne

4 / 5 Profondeur des racines
1 / 5 Résistance au stress hydrique



Intolérant à semi-intolérant à l'ombre



Semi-tolérant aux inondations



MILIEU IDÉAL

SEC HUMIDE
SABLE ARGILE
ACIDE ALCALIN

3 / 5 Capacité de migration
Aptitude de l'essence à se disperser naturellement dans les zones de gain d'habitat.


nd / 5 Capacité d'adaptation
Aptitude de l'essence à survivre et s'adapter dans les zones de perte d'habitat.

Cette carte représente ce que pourrait devenir l'habitat futur du caryer cordiforme dans un scénario climatique pessimiste (RCP 8.5).

En 2041-2070, le CAC pourrait profiter d'un gain d'habitat dans une grande partie du sud de la province, en plus d'un maintien de son habitat actuel en Montérégie.

Il n'existe présentement pas de données scientifiques concernant la capacité d'adaptation du CAC.

HABITAT FUTUR DU CARYER CORDIFORME



Habitat Futur

- Favorable
- Gain d'habitat
- Perte d'habitat
- Pas un habitat

Hydrographie

- Flleuve Saint-Laurent

Découpage administratif

- Région administrative
- Municipalité Régionale de Comté
- MRC des Laurentides
- MRC des Pays-d'en-Haut
- Ville

Projection : Québec Lambert
Réalisation : CERFO
Date : Janvier 2026

Essences

MRC

Groupes fonctionnels

		AL	L	PDH	A
1A	EPR				
	PIB				
	THO				
1B	PIR				
2A	ERS				
2C	BOJ				
	ERR				
3B	CET				

Essences détaillées au verso

ESSENCES COMPAGNES SUGGÉRÉES

Ces essences sont toutes recommandées en accompagnement du caryer cordiforme dans le but d'accroître la diversité fonctionnelle

Ces essences compagnes sont toutes :

- dans un **groupe fonctionnel** différent du CAC, ce qui signifie qu'elles apportent des fonctions complémentaires au CAC dans l'écosystème;
- disponibles dans les **pépinières publiques**.

Le **code de couleur** indique que l'espèce est adaptée au climat futur* (2041-2070) attendu dans ces quatre MRC :

- Antoine-Labelle (AL)
- Laurentides (L)
- Pays-d'en-Haut (PDH)
- Argenteuil (A)

L'ajout des MRC Antoine-Labelle et Argenteuil permet d'obtenir un portrait du gradient nord-sud de la région des Laurentides.

GROUPES FONCTIONNEL du Caryer cordiforme

4A

*D'après le modèle « Devenir des Habitats » du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

DÉFINITION DES GROUPES FONCTIONNELS

Groupe fonctionnel	Définitions
1A	Conifères, tolérants à l'ombre
1B	Pins, intolérants à l'ombre, tolérants à la sécheresse
2A	Tolérants à l'ombre, feuilles larges et minces
2B	Maronniers
2C	Grands arbres tolérants à l'inondation
3A	Petits arbres tolérants à la sécheresse
3B	Groupe «moyen» intolérant à l'inondation
4A	Grands, semences et bois lourds, tolérants à la sécheresse
4B	Légumineuses
5	Croissance rapide et tolérance aux inondations

De façon simplifiée : les groupes fonctionnels sont des regroupements d'espèces d'arbres qui offrent les mêmes services à l'écosystème, et qui ont les mêmes traits «caractéristiques».

La diversité fonctionnelle consiste à mélanger différents groupes fonctionnels dans un même environnement pour en améliorer la résilience.

Pour plus d'informations sur les groupes fonctionnels, visitez : <https://paqlab.uqam.ca/approche-fonctionnelle.php>

ESSENCES COMPAGNES SUGGÉRÉES - ACCESSIBLES EN PÉPINIÈRE PUBLIQUE

En accompagnement du CAC

Groupe fonctionnel	Code	Français	English	Scientifique
1A	EPR	Épinette rouge	Red spruce	<i>Picea rubens</i>
	PIB	Pin blanc	Eastern white pine	<i>Pinus strobus</i>
	THO	Thuja occidental	Eastern white cedar	<i>Thuja occidentalis</i>
1B	PIR	Pin rouge	Red pine	<i>Pinus resinosa</i>
2A	ERS	Érable à sucre	Sugar maple	<i>Acer saccharum</i>
2C	BOJ	Bouleau jaune	Yellow birch	<i>Betula alleghaniensis</i>
	ERR	Érable rouge	Red maple	<i>Acer rubrum</i>
3B	CET	Ceriser tardif	Black berry	<i>Prunus serotina</i>

Plus de fiches
Plus d'informations
et les références



cerfo.qc.ca



AUTRES ESSENCES COMPAGNES - MOINS ACCESSIBLES EN PÉPINIÈRE PUBLIQUE

En accompagnement du CAC

Groupe fonctionnel	Code	Français	English	Scientifique	AL	L	PDH	A
1A	PRU	Pruche du Canada	Eastern hemlock	<i>Tsuga canadensis</i>				
2A	ERN	Érable noir	Black maple	<i>Acer nigrum</i>				
	HEG	Hêtre à grandes feuilles	American beech	<i>Fagus grandifolia</i>				
	ORT	Orme liège	Rock elm	<i>Ulmus thomasi</i>				
	OSV	Ostryer de Virginie	American hophornbeam	<i>Ostrya virginiana</i>				
	TIL	Tilleul d'Amérique	American basswood	<i>Tilia americana</i>				
2C	CEO	Micocoulier occidental	Common hackberry	<i>Celtis occidentalis</i>				
	ERA	Érable argenté	Silver maple	<i>Acer saccharinum</i>				
	FRA	Frêne d'Amérique	American ash	<i>Fraxinus americana</i>				
	FRN	Frêne noir	American black ash	<i>Fraxinus nigra</i>				
	ORA	Orme d'Amérique	American elm	<i>Ulmus americana</i>				
	ORR	Orme rouge	Slippery elm	<i>Ulmus rubra</i>				
5	BOP	Bouleau à papier	White birch	<i>Betula papyrifera</i>				
	PEB	Peuplier baumier	Balsam poplar	<i>Populus balsamifera</i>				
	PED	Peuplier deltoïde	Eastern cottonwood	<i>Populus deltoides</i>				
	PEG	Peuplier à grandes dents	Largetooth aspen	<i>Populus grandidentata</i>				
	PET	Peuplier faux-tremble	Trembling aspen	<i>Populus tremuloides</i>				

LÉGENDE

- Adaptée au climat de 2041-2070*
- Non adaptée au climat de 2041-2070*
- Menacée par une épidémie

AL : Antoine-Labelle
L : Laurentides
PDH : Pays-d'en-haut
A : Argenteuil



Les essences menacées par une épidémie «globale» ont été laissées dans le tableau.

La présence naturelle de ces essences dans le peuplement peut ajouter de la diversité fonctionnelle dans votre forêt.

Un projet financé par



*D'après le modèle « Devenir des Habitats » du ministère des Ressources naturelles et des Forêts.